

# 抗がん剤療法

疾患名	大腸がん	レジメン番号	0204007
プロトコール登録名称	FOLFIRI+ベクティビックス(トレフューザーポンプS使用)療法		

## 【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	250 mL	div メイン1	ライン キープ用	1日目	
Rp2	アロキシ点滴静注0.75mg デキサート注6.6mg	1 袋 1 V	div メイン1	15 分	1日目	
Rp3	ベクティビックス注 生理食塩液	mg 100 mL	div メイン2	60分 ※	1日目	6 mg/kg
Rp4	イリノテカン注 5%ブドウ糖液	mg 250 mL	div メイン2	2 時間	1日目	150 mg/m <sup>2</sup>
Rp5	レボホリナート注 5%ブドウ糖液	mg 250 mL	div 側管 Rp4.と 同時に	2 時間	1日目	200 mg/m <sup>2</sup>
Rp6	フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液	mg 50 mL	bolus メイン2	3 分	1日目	400 mg/m <sup>2</sup>
Rp7	生理食塩液	Rp1 使用	メイン1	ルート内 フラッシュ	1日目	
Rp8	フルオロウラシル注 生理食塩液	mg mL	トレフュー ザーポンプS	46 時間	1日目	2400 mg/m <sup>2</sup>
Rp9	生食シリンジ ヘパリンNaロック用シリンジ	10 mL 10 mL	ポンプ終了後 フラッシュ用		3日目	
	デカドロン錠	8 mg	経口		2,3,4日目	

## 【期間】

2週1回