

# 抗がん剤療法

疾患名	大腸がん	レジメン番号	0204010
プロトコール登録名称	FOLFIRI+ザルトラップ <sup>®</sup> (トレフューザーポンプ <sup>S</sup> 使用)療法		

## 【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	250 mL	メイン1	ルート キープ用	1日目	
Rp2	アロキシン点滴静注0.75mg	1 袋	div	15 分	1日目	
	デキサート注6.6mg	1 V	メイン1			
Rp3	生理食塩液	Rp1 使用	div メイン1	ルート内 フラッシュ用	1日目	
Rp4	ザルトラップ注	mg	div メイン2	60 分	1日目	4 mg/kg
	生理食塩液	100 mL				
Rp5	生食食塩液	50 mL	div メイン2	ルート内 フラッシュ	1日目	
Rp6	イリノテカン注	mg	div メイン2	2 時間	1日目	150 mg/m <sup>2</sup>
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp7	レボホリナート注	mg	div 側管 Rp6.と同時に	2 時間	1日目	200 mg/m <sup>2</sup>
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp8	フルオロウラシル注	mg	bolus メイン2	3 分	1日目	400 mg/m <sup>2</sup>
	5%ブドウ糖液	50 mL				
Rp9	生理食塩液	Rp1 使用	メイン1	ルート内 フラッシュ	1日目	
Rp10	フルオロウラシル注	mg	トレフューザー ポンプ <sup>S</sup>	46 時間	1日目	2400 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液	mL				
Rp11	生食シリンジ	10 mL	ポンプ終了後 フラッシュ用		3日目	
	ヘパリンNaロック用シリンジ	10 mL				
	デカドロン錠	8 mg	経口		2,3,4日目	

## 【期間】

2週1回