

抗がん剤療法

| | |
|------------|----------|
| プロトコール登録名称 | PH+DTX療法 |
|------------|----------|

【プロトコール内容】

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 | 標準投与量 |
|-----|------------|--------|-------------|-------------------|--------------|------------------------------|
| Rp1 | 生理食塩液 | 50 mL | div メイン1 | ルート キープ用 | 1日目 | |
| Rp2 | パージェタ | 840 mg | div メイン2 | 初回60分 2回目以降30分 | 1日目 | 初回840mg/body 以降420mg/body |
| | | 420 mg | | | | |
| | 生理食塩液 | 250 mL | | | | |
| Rp3 | トラスツズマブ | mg | div メイン2 | 90分 | 初回 1日目 | 初回 8 mg/kg |
| | 注射用水 | mL | | | | |
| | 生理食塩液 | 250 mL | | | | |
| Rp4 | トラスツズマブ | mg | div メイン2 | 30分 | 2回目以降 1日目 | 以降 6 mg/kg |
| | 注射用水 | mL | | | | |
| | 生理食塩液 | 250 mL | | | | |
| Rp5 | デキサート6.6mg | 1 V | div メイン1 | 15分 | 1日目 | |
| | 生理食塩液50ml | 1 袋 | | | | |
| Rp6 | ドセタキセル注 | mg | div メイン2 | 60分 | 1日目 | 75 mg/m ² |
| | 5%ブドウ糖液 | 250 mL | | | | |
| Rp7 | 生理食塩液 | 50 mL | メイン1 | ウォッシュ アウト用 | 1日目 | |

パージェタは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可能。

トラスツズマブは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可能。

※初回はinfusion reactionの発現回避目的として前投薬(カロナール500mg/回)を考慮

