

抗がん剤療法

プロトコール登録名称	PH+エリブリン療法
------------	------------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ライン キープ用	1,8日目	
Rp2	パージェタ	840 mg	div メイン2	初回60分	1日目	初回840mg/日 以降420mg/日
		420 mg		2回目以降30分		
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	トラスツズマブ	mg	div メイン2	90分	初回	初回 8 mg/kg
	注射用水	mL			1日目	
	生理食塩液	250 mL				
Rp4	トラスツズマブ	mg	div メイン2	30分	2回目以降	以降 6 mg/kg
	注射用水	mL			1日目	
	生理食塩液	250 mL				
Rp5	エリブリン注	mg	div メイン2	5分	1,8日目	1.4 mg/m ²
Rp6	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ウォッシュ アウト用	1,8日目	

パージェタは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可能。

トラスツズマブは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可能。

※初回はinfusion reactionの発現回避目的として前投薬(カロナール500mg/回)を考慮

【期間】

