

# 抗がん剤療法

プロトコール登録名称

EC+キイトルーダ療法(術前薬物療法②)

## 【プロトコール内容】

|     | 薬剤名              | 投与量    | 投与経路 | 投与時間          | 投与日            | 標準投与量                           |
|-----|------------------|--------|------|---------------|----------------|---------------------------------|
| Rp1 | 生理食塩液            | 50 mL  | メイン1 | ライン<br>キープ用   | 1日目            |                                 |
|     |                  |        |      |               |                |                                 |
| Rp2 | キイトルーダ注          | 200 mg | メイン2 | 30分           | 1日目            | 200mg/日                         |
|     | 生理食塩液            | 50 mL  |      |               |                |                                 |
| Rp3 | 生理食塩液            | 50 mL  | メイン2 | ルート<br>フラッシュ  | 1日目            |                                 |
| Rp4 | アロカリス点滴静注235mg   | 1 V    | メイン1 | 30分           | 1日目            |                                 |
|     | パロノセトロンバッグ0.75mg | 1 袋    |      |               |                |                                 |
|     | デキサート注6.6mg      | 1.5 V  |      |               |                |                                 |
| Rp5 | 生理食塩液            | 50 mL  | メイン1 | ウォッシュ<br>アウト用 | 1日目            |                                 |
| Rp6 | エピルビシン注          | mg     | メイン2 | 15分<br>自然滴下   | 1日目            | 90 mg/m <sup>2</sup>            |
|     | 生理食塩液            | 100 mL |      |               |                |                                 |
| Rp7 | エンドキサン注          | mg     | メイン2 | 30分           | 1日目            | 600 mg/m <sup>2</sup>           |
|     | 生理食塩液            | 100 mL |      |               |                |                                 |
| Rp8 | 生理食塩液            | 50 mL  | メイン1 | ウォッシュ<br>アウト用 | 1日目            |                                 |
|     | デカドロン錠           | 8 mg   | 経口   |               | 2,3,4日目<br>(※) | ※状況に応じて<br>投与の可否を選択<br>できるものとする |

## 【期間】

1サイクル21日間

4サイクル実施予定