

# 抗がん剤療法

プロトコール登録名称	PH(皮下注) + TC療法
------------	----------------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	パロノセトロンバッグ0.75mg デキサート注6.6mg	1 袋 1 V	メイン1	15 分	1日目	
Rp3	ドセタキセル注 5%ブドウ糖液	mg 250 mL	メイン2	60 分	1日目	75 mg/m <sup>2</sup>
Rp4	カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	mg 250 mL	メイン2	60 分	1日目	AUC 6
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp6	フェスゴ配合皮下注IN	15 mL	皮下注	8分以上	初回 1日目	
Rp7	フェスゴ配合皮下注MA	10 mL	皮下注	5分以上	2回目以降 1日目	

フェスゴ配合皮下注は初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は5分間以上まで短縮可能。

※初回はinfusion reactionの発現回避目的として前投薬(カロナール500mg/回)を考慮

【期間】

1サイクル21日