

抗がん剤療法

ダトポタマブ デルクステカン療法

プロトコール登録名称

【プロトコール内容】

※infusion reactionの発現回避目的として前投薬(カロナール500mg/回)を内服

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	5%ブドウ糖注射液	50 mL	メイン1	ライン キープ用	1日目	
Rp2	パロノセトロンバッグ0.75mg	1 袋	div メイン1	30 分	1日目	
	デキサート注6.6mg	1 V				
	ファモチジン注20mg	1 A				
	ポララミン注5mg	1 A				
Rp3	5%ブドウ糖注射液	50 mL	メイン1	ルート フラッシュ用	1日目	
Rp4	ダトロウェイ点滴静注	mg	div メイン2	90分	1日目	6 mg/kg
	5%ブドウ糖注射液	100 mL				
	(1Vあたり注射用水5mLで溶解)					
Rp5	5%ブドウ糖注射液	50 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	1日目	
	デカドロン	8 mg	経口		2,3,(4)日目	

ダトロウェイは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮できます。

【期間】

3週に1回

___サイクル実施予定