

抗がん剤療法

FP+キイトルーダ療法(シスプラチン抜き) (インフューザーポンプ使用)

プロトコール登録名称

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ 用	1日目	
Rp2	キイトルーダ注	200 mg	メイン2	30分	1日目	200 mg/日
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	ウォッシュ アウト用	1日目	
Rp4	デキサート注6.6mg	1 V	メイン1	15分	1日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルート フラッシュ用	1日目	
Rp6	フルオロウラシル注	mg	インフューザー ポンプ LV	120時間	1,2,3,4,5日目	4000 mg/m ² (1日800mg/m ²)
	生理食塩液	250 mL				
Rp7	生食シリンジ	10 mL		ポンプ終了後 フラッシュ用	6日目	
	ヘパリンロック	10 mL				
	デカドロン錠	8 mg	経口		2,3,4,5日目	

【期間】

1コース21日間

疾患進行又は許容できない毒性発現まで継続

次コース開始

