抗がん剤療法

プロトコール登録名称	FP＋チスレリズマブ療法(シスプラチンあり)

【プロトコール内容】

【1日目】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	ソリタT3	500 mL	メイン1	1.5 時間	1日目	
	硫酸マグネシウム補正液	10 mL				
Rp2	ソリタT3	500 mL	メイン1	1.5 時間	1日目	
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ライン フラッシュ用	1日目	
Rp4	テビムブラ注	200 mg	メイン2	60 分	1日目	200 mg/日
	生理食塩液	50 mL				
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン2	ウォッシュ アウト用	1日目	
Rp6	ホスアプレピタント注150mg	1 V	メイン1	15 分	1日目	
	デキサート注6.6mg	1.5 V				
	パロノセトロンバッグ0.75mg	1 袋				
Rp7	生理食塩液	50 mL	メイン1	ライン フラッシュ用	1日目	
Rp8	シスプラチン注	mg	メイン2	2 時間	1日目	80 mg/m^2
	生理食塩液	500 mL				
Rp9	フロセミド注	20 mg	側管1	iv	1日目	
Rp10	フルオロウラシル注	mg	メイン2	24 時間	1日目	800 mg/m^2
	生理食塩液	500 mL				
Rp11	生理食塩液	500 mL	側管1 Rp10.フルオロウラシルと同時に	3 時間	1日目	
Rp12	生理食塩液	500 mL	側管1	3 時間	1日目	

【2,3,4,5日目】

Rp1	デキサート注6.6mg	1 V	メイン1 (メイン2をとめて)	15 分	2,3,4,5日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp2	フルオロウラシル注	mg	メイン2	24 時間	2,3,4,5日目	800 mg/m^2
	生理食塩液	500 mL				
Rp3	ソリタT3	500 mL	側管1	3 時間	2,3日目	
Rp4	ソリタT3	500 mL	側管1	3 時間	2,3日目	
Rp5	生理食塩液	100 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	5日目	

※テビムブラ注は初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与は30分間とすることが出来ます。

※内服可能な場合は制吐剤としてオランザピンを考慮(糖尿病患者には禁忌、後期高齢者への積極的な使用は避ける)

【期間】1コース21日間

シスプラチンは最大6サイクルまで
終了後は、シスプラチン抜き療法へ