


# 抗がん剤療法

プロトコール登録名称	CDDP+PEM
------------	----------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ	1,2,3日目	
Rp2	デキサート注6.6mg	1 V	div メイン1	15分	1日目	
	パロノセトロンバッグ0.75mg	1袋				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルート内フラッシュ	1日目	
Rp4	硫酸マグネシウム	10 mL	div メイン1	90分	1日目	
	生理食塩液	500 mL				
Rp5	ペトレキセド注	mg	div メイン2	10分	1日目	500 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液	100 mL				
Rp6	ソルデム1	200 mL	div メイン1	30分	1日目	
Rp7	20%マンニトール	100 mL	div メイン1	30分	1日目	
Rp8	シスプラチン注	mg	div メイン2	120分	1日目	75 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液	500 mL				
Rp9	フロセミド20mg	20 mg	div メイン1	30分	1日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp10	ソルアセトF	500 mL	div メイン1	90分	1日目	
Rp11	ソルアセトF	500 mL	div メイン1	90分	1日目	
Rp12	ソルアセトF	500 mL	div メイン1	90分	1日目	
Rp13	ソルアセトF	500 mL	div メイン1	90分	1日目	
Rp14	デキサート注6.6mg	1 V	div メイン1	30分	2,3日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp15	ソルアセトF	500 mL	div メイン1	90分	2,3日目	
Rp16	ソルアセトF	500 mL	div メイン1	90分	2,3日目	
Rp17	ソルアセトF	500 mL	div メイン1	90分	2,3日目	



葉酸: ペトレキセド投与7日前から連日1日1回0.5mgを経口投与

ビタミンB12: ペトレキセド投与7日前に1回1mgを筋注し、その後約9週ごとに1回筋注する。

※葉酸、ビタミンB12 とともに最終投与日より22日目まで投与