

# 抗がん剤療法

プロトコール登録名称	CBDCA+ETP+Atezo
------------	-----------------

## 【プロトコール内容】

### 【1～4コース目】

#### 1日目

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
	アプレピタントカプセル125mg	1錠	経口	化学療法 開始前	1日目	
Rp1	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	テセントリク注	1200 mg	div メイン2	初回 ※1 60分	1日目	1200mg /body
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト 用	1日目	
Rp4	生理食塩液	50 mL	div メイン3	ラインキープ用	1日目	
Rp5			div メイン3	15分	1日目	
	デキサート注6.6mg	1.5 V				
	パロノセトロンバッグ0.75mg	1袋				
Rp6	カルボプラチン注	mg	div メイン4	60分	1日目	AUC 5
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp7	生理食塩液	50 mL	divメイン4	ラインフラッシュ用	1日目	
Rp8	エトポシド注	mg	div メイン4	60分	1日目	100 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液	500 mL				
Rp9	生理食塩液	50 mL	メイン3	ウォッシュアウト用	1日目	

#### 2,3日目

	アプレピタントカプセル80mg	1錠	経口	朝食後	2,3日目	
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	2,3日目	
Rp2	デキサート注6.6mg	1 V	div メイン1	15分	2,3日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	エトポシド注	mg	div メイン2	60分	2,3日目	100 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液	500 mL				
Rp4	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ウォッシュアウト 用	2,3日目	

### 【5コース目以降】

Rp1	生理食塩液	250 mL	div メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	テセントリク注	1200 mg	div メイン2	30分	1日目	1200mg /body
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	生理食塩液	Rp1 使用	div メイン1	ウォッシュアウト 用	1日目	

※テセントリクは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できます。

【期間】3週間に1回投与、5コース目以降はテセントリクのみPDIになるまで可能な限り継続

