


抗がん剤療法

プロトコール登録名称	CBDCA+PEM+Pembro (KEYNOTE-189)
------------	--------------------------------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
	アプレピタントカプセル125mg	1錠	経口	化学療法開始前	1日目	
Rp1	生理食塩液	50 mL				
Rp2	キイトルーダ注	200 mg	メイン2	30分	1日目	200mg/body
100%	生理食塩液	50 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	ルートフラッシュ	1日目	
Rp5	パロノセトロン点滴静注	1袋	メイン1	15分	1日目	
	デキサート注6.6mg	0.5 V				
Rp6	ペトレキセド注	mg	メイン2	10分	1日目	500 mg/m ²
	生理食塩液	100 mL				
Rp7	カルボプラチン注	mg	メイン2	60分	1日目	AUC 5
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp8	生理食塩液	Rp1 使用	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
	アプレピタントカプセル80mg	1錠	経口	朝食後	2,3日目	
	デカドロン錠	4 mg	経口		(2,3日目)	※医師の裁量により、減量・中止可能



葉酸: ペトレキセド投与7日前から連日1日1回0.5mgを経口投与

ビタミンB12: ペトレキセド投与7日前に1回1mgを筋注し、その後約9週ごとに1回筋肉投与する。

※葉酸、ビタミンB12 とともに最終投与日より22日目まで投与