

# 抗がん剤療法

プロトコール登録名称

CDDP+GEM+Necitu (Short hydration) (JFCM/SQUIRE)

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
【1日目】						
Rp1	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ライン キープ用	1日目	
Rp2	ホスアプレピタント注150mg	1 V	div メイン1	15分	1日目	
	デキサート注6.6mg	1.5 V				
	パロノセトロンバッグ0.75mg	1 袋				
Rp3	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ルート フラッシュ	1日目	
Rp4	ポートラーザ注	800 mg	div メイン2	1時間	1日目	800 mg/日
	生理食塩液	250 mL				
Rp5	生理食塩液	500 mL	div 側管 Rp4と同時に	1時間	1日目	
Rp6	生理食塩液	50 mL	div メイン2	ルート フラッシュ	1日目	
Rp7	ゲムシタピン注	mg	div メイン2	30分	1日目	1250 mg/m <sup>2</sup>
	5%ブドウ糖液	50 mL				
Rp8	ソリタT3	500 mL	div メイン1	1時間	1日目	
	硫酸マグネシウム	10 mL				
Rp9	20%マンニトール	300 mL	div メイン1	30分	1日目	
Rp10	シスプラチン注	mg	div メイン2	1時間	1日目	75 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液	500 mL				
Rp11	生理食塩液	500 mL	div メイン1	1時間	1日目	
Rp12	ソリタT3	500 mL	div メイン1	1時間	1日目	
	デカドロン	8 mg	経口	朝食後	2,3,4日目	

【8日目】

Rp1	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ルート キープ	8日目	
Rp2	デキサート6.6mg	1 V	div メイン1	15分	8日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ルート フラッシュ	8日目	
Rp4	ポートラーザ注	800 mg	div メイン2	1時間	8日目	800 mg/日
	生理食塩液	250 mL				
Rp5	生理食塩液	50 mL	div メイン2	ルート フラッシュ	8日目	
Rp6	ゲムシタピン注	mg	div メイン2	30分	8日目	1250 mg/m <sup>2</sup>
	5%ブドウ糖液	50 mL				
Rp7	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ウォッシュ アウト	8日目	

経口補液: 当日シスプラチン終了までに1L程度の飲水、2、3日目1L/日程度の飲水または補液を考慮

【期間】1コース21日間

計4~6コース施行予定、その後メンテナンス療法(ポートラーザ単独)へ

