

抗がん剤療法

プロトコール登録名称

CBDCA+nabPTX+Durva+Tremeli(POSEIDON)

【プロトコール内容】

【1日目】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
	アプレピタントカプセル125mg	1錠	経口	化学療法開始	1日目	
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	イジユド注	75 mg	メイン2	60分	1日目	75mg/日
	生理食塩液	100 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp4	イミフィンジ注	1500 mg	メイン2	60分	1日目	1500mg/日
	生理食塩液	250 mL				
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp6	生理食塩液	50 mL	メイン3	ラインキープ用	1日目	
Rp7	パロノセトロン注0.75mg	1袋				
	デキサート注6.6mg	0.5 V	メイン3	15分	1日目	
Rp8	生理食塩液	50 mL	メイン3	ルートフラッシュ用	1日目	
Rp9	アブラキサン注	mg	メイン4	30分	1日目	100 mg/m ²
	生理食塩液	50 mL				
Rp10	生理食塩液	50 mL	メイン4	ルートフラッシュ用	1日目	
Rp11	カルボプラチン注	mg	メイン4	60分	1日目	AUC 5~6
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp12	生理食塩液	50 mL	メイン3	ウォッシュアウト用	1日目	
	アプレピタントカプセル80mg	1錠	経口	朝食後	2,3日目	
	デカドロン錠	4 mg	経口		2,3,4日目	

【8,15日目】

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	8,15日目	
Rp2	デキサート注6.6mg	1 V				
	生理食塩液	50 mL	メイン1	15分	8,15日目	
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートフラッシュ用	8,15日目	
Rp4	アブラキサン注	mg	メイン2	30分	8,15日目	100 mg/m ²
	生理食塩液	50 mL				
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	8,15日目	

※イミフィンジは体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kgとする

【期間】

1サイクル21日間

4サイクル実施予定

CBDCA+アブラキサン+イミフィンジ+イジユド(3週毎)→イミフィンジ+イジユド(8週毎)→イミフィンジmaintenance(4週毎)