

# 抗がん剤療法

プロトコール登録名称

CBDCA+GEM+Durva+Tremeli (POSEIDON)

## 1日目


	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	イジユド注	75 mg	メイン2	60分	1日目	75mg/日
	生理食塩液	100 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp4	イミフィンジ注	1500 mg	メイン2	60分	1日目	1500mg/日
	生理食塩液	250 mL				
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン2	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp6	ホスアプレピタント注150mg	1 V	メイン1	15分	1日目	
	パロノセトロン注0.75mg	1 袋				
	デキサート注6.6mg	0.5 V				
Rp7	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートフラッシュ用	1日目	
Rp8	ゲムシタピン注	mg	メイン2	30分	1日目	1000 mg/m <sup>2</sup>
	5%ブドウ糖液	50 mL				
Rp9	カルボプラチン注	mg	メイン2	60分	1日目	AUC 5~6
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp10	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
	デカドロン錠	8 mg	経口		2.3.4日目	

## 8日目

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	8日目	
Rp2	デキサート注6.6mg	1 A	メイン1	15分	1,8日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	ゲムシタピン注	mg	メイン2	30分	8日目	1000 mg/m <sup>2</sup>
	5%ブドウ糖液	50 mL				
Rp4	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	8日目	

※イミフィンジは体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kgとする

【期間】1サイクル 21日間 4サイクル



GEM+CBDCA+イミフィンジ+イジユド(3週毎)→イミフィンジ+イジユド(8週毎)→イミフィンジmaintenance(4週毎)