


抗がん剤療法

プロトコール登録名称	CBDCA+PEM+Durva+Tremeli(POSEIDON)
------------	-----------------------------------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
	アプレピタントカプセル125mg	1錠	経口	化学療法開始前	1日目	
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	イジユド注	75 mg	メイン2	60分	1日目	75mg/日
	生理食塩液	100 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp4	イミフィンジ注	1500 mg	メイン2	60分	1日目	1500mg/日
	生理食塩液	250 mL				
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン2	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp6	パロノセトロン注0.75mg	1袋	メイン1	15分	1日目	
	デキサート注6.6mg	0.5 V				
Rp7	ペムトレキセド注	mg	メイン2	10分	1日目	500 mg/m ²
	生理食塩液	100 mL				
Rp8	カルボプラチン注	mg	メイン2	60分	1日目	AUC 5
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp9	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
	アプレピタントカプセル80mg	1錠	経口	朝食後	2,3日目	
	デカドロン錠	4 mg	経口		2,3,4日目	



CBDCA+PEM+イミフィンジ+イジユド(3週毎)4サイクル

→PEM+イミフィンジ+イジユド(8週毎)→PEM+イミフィンジmaintenance(4週毎)

葉酸:ペムトレキセド投与7日前から連日1日1回0.5mgを経口投与

ビタミンB12:ペムトレキセド投与7日前に1回1mgを筋注し、その後約9週ごとに1回筋肉投与する。

※葉酸、ビタミンB12 とともに最終投与日より22日目まで投与