

抗がん剤療法


プロトコール登録名称

(術前)CDDP+PEM+Nivo(CheckMate-816)

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ	1,2,3日目	
Rp2	オブジーボ注	360 mg	メイン2	30分	1日目	360mg/日
	生理食塩液	100 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	ラインフラッシュ	1日目	
Rp4	アロカリス235mg	1 V	メイン1	30分	1日目	
	デキサート注6.6mg	1.5 V				
	パロノセトロン注0.75mg	1 袋				
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートフラッシュ	1日目	
Rp6	硫酸マグネシウム	10 mL	メイン1	90分	1日目	
	生理食塩液	500 mL				
Rp7	ペムトレキセド注	mg	メイン2	10分	1日目	500 mg/m ²
	生理食塩液	100 mL				
Rp8	ソルデム1	200 mL	メイン1	30分	1日目	
Rp9	20%マンニトール	100 mL	メイン1	30分	1日目	
Rp10	シスプラチン注	mg	メイン2	120分	1日目	75 mg/m ²
	生理食塩液	500 mL				
Rp11	フロセミド20mg	20 mg	メイン1	30分	1日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp12	ソルアセトF	500 mL	メイン1	90分	1日目	
Rp13	ソルアセトF	500 mL	メイン1	90分	1日目	
Rp14	ソルアセトF	500 mL	メイン1	90分	1日目	
Rp15	ソルアセトF	500 mL	メイン1	90分	1日目	
Rp16	デキサート注6.6mg	1 V	メイン1	30分	2,3日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp17	ソルアセトF	500 mL	メイン1	90分	2,3日目	
Rp18	ソルアセトF	500 mL	メイン1	90分	2,3日目	
Rp19	ソルアセトF	500 mL	メイン1	90分	2,3日目	

【期間】 1サイクル21日間 最大3サイクル



【備考】

葉酸: ペムトレキセド投与7日前から連日1日1回0.5mgを経口投与

ビタミンB12: ペムトレキセド投与7日前に1回1mgを筋注し、その後約9週ごとに1回筋注する。

※葉酸、ビタミンB12 とともに最終投与日より22日目まで投与