

# 抗がん剤療法 プロトコール登録票

プロトコール登録名称

CBDCA + nab-PTX + Atezo (IMPower130)

【1日目】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
	アプレピタントカプセル125mg	1 錠	経口	化学療法開始前	1日目	
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	テセントリク注 生理食塩液	1200 mg 250 mL	メイン2	初回 ※ 60 分	1日目	1200mg/body
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートフラッシュ用	1日目	
Rp4	生理食塩液	50 mL	メイン3	ラインキープ用	1日目	
Rp5	グラニセトン注1mg デキサート注6.6mg 生理食塩液	1 A 0.5 V 100 mL	メイン3	15 分	1日目	
Rp6	生理食塩液	50 mL	メイン3	ルートフラッシュ用	1日目	
Rp7	アブラキサン注 生理食塩液	mg 50 mL	メイン4	30 分	1日目	100 mg/m <sup>2</sup>
Rp8	生理食塩液	50 mL	メイン4	ルートフラッシュ用	1日目	
Rp9	カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	mg 250 mL	メイン4	60 分	1日目	AUC 6
Rp10	生理食塩液	50 mL	メイン3	ウォッシュアウト用	1日目	
	アプレピタントカプセル80mg	1 錠	経口	朝食後	2,3日目	
	デカドロン錠	4 mg	経口	朝食後	2,3,4日目	

【8,15日目】

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	8,15日目	
Rp2	デキサート注6.6mg 生理食塩液	1 V 50 mL	メイン1	15 分	8,15日目	
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートフラッシュ用	8,15日目	
Rp4	アブラキサン注 生理食塩液	mg 50 mL	メイン2	30 分	8,15日目	100 mg/m <sup>2</sup>
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	8,15日目	

※テセントリクは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できます。

【期間】

1サイクル21日間

4~6サイクル実施予定

その後テセントリク単剤で維持投与