

抗がん剤療法


CBDCA + ペメトレキセド + テセントリク

プロトコール登録名称

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
	アプレピタントカプセル125mg	1錠	経口	化学療法 開始前	1日目	
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ライン キープ用	1日目	
Rp2	テセントリク注	1200 mg	メイン2	初回 ※ 60分	1日目	1200mg/body
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	ルート フラッシュ用	1日目	
Rp4	パロノセトロン注0.75mg	1袋	メイン1	15分	1日目	
	デキサート注6.6mg	0.5 V				
Rp5	ペメトレキセド注	mg	メイン2	10分	1日目	500 mg/m ²
	生理食塩液	100 mL				
Rp6	カルボプラチン注	mg	メイン2	60分	1日目	AUC 6
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp7	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	1日目	
	アプレピタントカプセル80mg	1錠	経口	朝食後	2,3日目	
	デカドロン錠	4 mg	経口		2,3,4日目	

※テセントリクは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できます。



葉酸: ペメトレキセド投与7日前から連日1日1回0.5mgを経口投与

ビタミンB12: ペメトレキセド投与7日前に1回1mgを筋注し、その後約9週ごとに1回筋肉投与する。

葉酸、ビタミンB12 ともに最終投与日より22日目まで投与