


抗がん剤療法

プロトコール登録名称	PEM+Atezo(維持療法)
------------	-----------------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ライン キープ用	1日目	
Rp2	テセントリク注	1200 mg	メイン2	初回 ※ 60分	1日目	1200mg/body
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	ルート フラッシュ用	1日目	
Rp4	デキサート注6.6mg	1 V	メイン1	15分	1日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp5	ペムトレキシド注	mg	メイン2	10分	1日目	500 mg/m ²
	生理食塩液	100 mL				
Rp6	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	1日目	

※テセントリクは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できます。



葉酸: ペムトレキシド投与7日前から連日1日1回0.5mgを経口投与

ビタミンB12: ペムトレキシド投与7日前に 1回1mgを筋注し、その後約9週ごとに1回筋肉投与する。

葉酸、ビタミンB12 とともに最終投与日より22日目まで投与