

抗がん剤療法


プロトコール登録名称	CBDCA+PEM+Osimertinib (FLAURA2)
------------	---------------------------------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	アロカリス点滴静注235mg	1 V	メイン1	30分	1日目	
	グラニセトロン注1mg	1 A				
	デキサート注6.6mg	0.5 V				
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	ペムトレキセド注	mg	メイン2	10分	1日目	500 mg/m ²
	生理食塩液	100 mL				
Rp4	カルボプラチン注	mg	メイン2	60分	1日目	AUC 5
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp5	生理食塩液	Rp1 使用	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
	オシメルチニブ錠 (タグリッソ錠)	80 mg	経口	1日1回	1日目より連日投与	80 mg/日
	デカドロン錠	4 mg	経口		2,3日目 (省略可能)	

【期間】

1コース21日間 4コース施行後、PEM+オシメルチニブ維持療法へ



葉酸: ペムトレキセド投与7日前から連日1日1回0.5mgを経口投与

ビタミンB12: ペムトレキセド投与7日前に 1回1mgを筋注し、その後約9週ごとに1回筋肉投与する。

※葉酸、ビタミンB12 とともに最終投与日より22日目まで投与