

## 抗がん剤療法

プロトコール登録名称	<b>CBDCA+ペメトレキセド+アミバンタマブ療法 1サイクル目(体重80kg未満)</b>
------------	---

【プロトコール内容】

【1日目】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	アロカリス点滴静注235mg	1 V	メイン1	30分	1日目	
	グラニセロン注1mg	1 A				
	デキサート注6.6mg	1.5 V				
	ファモチジン注20mg	1 A				
	ボララミン注5mg	1 A				
	生理食塩液	100 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp4	アセリオ点滴静注	1000 mg	メイン1	15分	1日目	
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp6	ペメトレキセド注	mg	メイン2	10分	1日目	500 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液	100 mL				
Rp7	カルボプラチン注	mg	メイン2	60分	1日目	AUC 5
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp8	生理食塩液	50 mL	メイン2	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp9	ライプリバント注	350 mg	メイン2	投与開始時 50mL/時 投与開始2時間後 75mL/時	1日目	350mg/body
	生理食塩液	250 mL				
Rp10	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートフラッシュ	1日目	

【2,(3)日目】


Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	2日目	
Rp2	デキサート注6.6mg	1 V	メイン1	15分		
	ファモチジン注20mg	1 A				
	ボララミン注5mg	1 A				
	生理食塩液	100 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	2日目	
Rp4	アセリオ点滴静注	1000 mg	メイン1	15分	2日目	
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	2日目	
Rp6	ライプリバント注	1050 mg	メイン2	投与開始時 33mL/時 投与開始2時間後 50mL/時	2日目	1050mg/body
	生理食塩液	250 mL				
Rp7	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートフラッシュ	2日目	
	デカドロン錠	4 mg	経口		2,3日目 (省略可能)	

【8,15日目】

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	8,15日目	
Rp2	デキサート注6.6mg	1 A	メイン1	15分	8,15日目	
	ファモチジン注20mg	1 A				
	ボラミン注5mg	1 A				
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートフラッシュ	8,15日目	
Rp3	アセリオ点滴静注	1000 mg	メイン1	15分	8,15日目	
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	8,15日目	
Rp4	ライプリバント注	1400 mg	メイン2	8日目 65mL/h 15日目 85mL/h	8,15日目	1400mg/body
	生理食塩液	250 mL				
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートフラッシュ	8,15日目	

【期間】

1コース21日間



葉酸: ペトレキセド投与7日前から連日1日1回0.5mgを経口投与

ビタミンB12: ペトレキセド投与7日前に1回1mgを筋注し、その後約9週ごとに1回筋肉投与する。

葉酸、ビタミンB12ともに最終投与日より22日目まで投与