

## 抗がん剤療法

プロトコール登録名称	<b>PEM+アミバンタマブ療法</b> <b>5サイクル目以降(体重80kg未満)</b>
------------	---


【プロトコール内容】

【1日目】

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	デキサート注6.6mg	1 V	メイン1	15分		
	ファモチジン注20mg	1 A				
	ポララミン注5mg	1 A				
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp4	アセリオ点滴静注	1000 mg	メイン1	15分	1日目	
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp6	ペムトレキセド注	mg	メイン2	10分	1日目	500 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液	100 mL				
Rp7	生理食塩液	50 mL	メイン2	ルートフラッシュ用	1日目	
Rp8	ライブリバント注	1750 mg	メイン2	125mL/h	1日目	1750mg/body
	生理食塩液	250 mL				
Rp9	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	

【期間】

1コース21日間



葉酸: ペムトレキセド投与7日前から連日1日1回0.5mgを経口投与

ビタミンB12: ペムトレキセド投与7日前に 1回1mgを筋注し、その後約9週ごとに1回筋肉投与する。

※葉酸、ビタミンB12 とともに最終投与日より22日目まで投与