

抗がん剤療法

プロトコール登録名称

Tarlatamab(1cycle)

【プロトコール内容】

【1日目】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ	1日目	
Rp2	デキサート注6.6mg	1 V	メイン1	30分	1日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインフラッシュ用	1日目	
Rp4	イムデトラ注	1 mg	メイン1	60分	1日目	1 mg/回
	生理食塩液 (1V注射用水1.3mLで溶解)	250 mL				
Rp5	生理食塩液	500 mL	メイン1	120分	1日目	
Rp6	生理食塩液	500 mL	メイン1	120分	1日目	

【8日目】

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	8日目	
Rp2	デキサート注6.6mg	1 V	メイン1	30分	8日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインフラッシュ用	8日目	
Rp4	イムデトラ注	10 mg	メイン1	60分	8日目	10 mg/回
	生理食塩液 (1V注射用水4.4mLで溶解)	250 mL				
Rp5	生理食塩液	500 mL	メイン1	120分	8日目	
Rp6	生理食塩液	500 mL	メイン1	120分	8日目	

【15日目】

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	15日目	
Rp2	イムデトラ注	10 mg	メイン1	60分	15日目	10 mg/回
	生理食塩液 (1V注射用水4.4mLで溶解)	250 mL				
Rp3	生理食塩液	500 mL	メイン1	120分	15日目	
Rp4	生理食塩液	500 mL	メイン1	120分	15日目	

【期間】

1サイクル28日間 1サイクル実施予定

【休薬期間と再開時の用量】

最終投与日、投与量	休薬期間	再開時の用量
1日目、1mg	14日以内	8日目の投与量(10mg)
	14日超	1日目の投与量(1mg)
8日目、10mg	21日以内	15日目の投与量(10mg)
	21日超	1日目の投与量(1mg)
15日目以降、10mg	28日以内	29日目以降の投与量(10mg)
	28日超	1日目の投与量(1mg)