

## 抗がん剤療法

プロトコール登録名称

5-FU/ℓ-LV+オニバイド(トレフューザーポンプS使用)療法

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	パロノセトロンバッグ0.75mg デキサート注6.6mg	1 袋 1 V	div (メイン1)	15 分	1日目	
Rp3	生理食塩液	50 mL	div (メイン1)	ルート フラッシュ用	1日目	
Rp4	オニバイド注 5%ブドウ糖液	mg 500 mL	div (メイン2)	90 分	1日目	70 mg/m <sup>2</sup>
Rp5	生理食塩液	50 mL	div (メイン1)	ルート フラッシュ用	1日目	
Rp6	レボホリナート注 5%ブドウ糖液	mg 250 mL	div (メイン1)	2 時間	1日目	200 mg/m <sup>2</sup>
Rp7	フルオロウラシル注 生理食塩液	mg mL	トレフュー ザーポンプS	46 時間	1日目	2400 mg/m <sup>2</sup>
Rp8	生食シリンジ ヘパリンロック	10 mL 10 mL		ポンプ終了後 フラッシュ用	3日目	
	デカドロン錠	8 mg	経口		(2,3日目)	※医師の裁量により 減量、削除可能

【期間】

2週1回