

抗がん剤療法

プロトコール登録名称	XP療法
------------	------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
--	-----	-----	------	------	-----	-------

【1～14日目】

	カペシタビン	mg	経口	朝夕食後	1日目夕食後 ～15日目朝食後	2000 mg/m ²
--	--------	----	----	------	--------------------	------------------------

【1日目】

Rp1	ソリタT3	500 mL	div メイン1	1.5 時間	1日目	
	硫酸マグネシウム補正液	10 mL				
Rp2	ソリタT3	500 mL	div メイン1	1.5 時間	1日目	
Rp3	ホスアプレピタント注150mg	1 V	div メイン1	15 分	1日目	
	デキサート注6.6mg	1.5 V				
	パロノセトロンバッグ0.75mg	1 袋				
Rp4	シスプラチン注	mg	div メイン2	2 時間	1日目	80 mg/m ²
	生理食塩液	500 mL				
Rp5	フロセミド注	20 mg	iV 側管	全開	1日目	
Rp6	生理食塩液	500 mL	div メイン1	3 時間	1日目	
Rp7	ソリタT3	500 mL	div メイン1	3 時間	1日目	

【2,3,4日目】

Rp1	デキサート注6.6mg	1 V	div メイン1	15 分	2,3,4日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp2	ソリタT3	500 mL	div メイン1	3 時間	2,3日目	
Rp3	ソリタT3	500 mL	div メイン1	3 時間	2,3日目	
Rp4	生理食塩液	100 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	2,3日目	

※オランザピン(1回5mg1日1回夕食後 d1-4)は糖尿病患者、後期高齢者以外に投与の検討する

【期間】

1コース21日間

___サイクル実施予定