

抗がん剤療法

プロトコール登録名称	CAPOX+トラスツズマブ療法
------------	-----------------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	トラスツズマブ	mg	div メイン2	90分	初回 1日目	初回8 mg/kg
	注射用水	mL				
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	トラスツズマブ	mg	div メイン2	30分	2回目以降 1日目	以降6 mg/kg
	注射用水	mL				
	生理食塩液	250 mL				
Rp4	パロノセトロンバッグ0.75mg	1袋	div メイン1	15分	1日目	
	デキサート注6.6mg	0.5 V				
Rp5	エルプラット注	mg	div メイン2	2時間	1日目	100 mg/m ²
	デキサート注6.6mg	0.5 A				
	5%ブドウ糖液	500 mL				
Rp6	5%ブドウ糖液	50 mL	div メイン1	ウォッシュ アウト用	1日目	
	カペシタピン	mg	経口	朝夕食後	1日目夕食後 ~15日目朝食後	2000 mg/m ² (1日量)
	デカドロン錠	8 mg	経口		(2,3日目)	※医師の裁量により 減量、中止可能

※トラスツズマブは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可能。

