

抗がん剤療法

| | |
|------------|---------------|
| プロトコール登録名称 | SOX+トラスツズマブ療法 |
|------------|---------------|

【プロトコール内容】

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 | 標準投与量 |
|-----|-------------|--------|-------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| Rp1 | 生理食塩液 | 50 mL | メイン1 | ラインキープ用 | 1日目 | |
| Rp2 | トラスツズマブ | mg | div メイン2 | 90分 | 初回 | 初回8 mg/kg |
| | 注射用水 | mL | | | 1日目 | |
| | 生理食塩液 | 250 mL | | | | |
| Rp3 | トラスツズマブ | mg | div メイン2 | 30分 | 2回目以降 | 以降6 mg/kg |
| | 注射用水 | mL | | | 1日目 | |
| | 生理食塩液 | 250 mL | | | | |
| Rp4 | パロノセトロンバッグ | 1袋 | div メイン1 | 15分 | 1日目 | |
| | デキサート注6.6mg | 0.5 V | | | | |
| Rp5 | エルプラット注 | mg | div メイン2 | 2時間 | 1日目 | 100 mg/m ² |
| | デキサート注6.6mg | 0.5 A | | | | |
| | 5%ブドウ糖液 | 500 mL | | | | |
| Rp6 | 5%ブドウ糖液 | 50 mL | メイン1 | ウォッシュアウト用 | 1日目 | |
| | TS-1 | mg | 経口 | 朝夕食後 | 1日目夕食後 ~15日目朝食後 | 80 mg/m ² |
| | デカドロン錠 | 8 mg | 経口 | | (2,3日目) | ※医師の裁量により減量、中止可能 |

※トラスツズマブは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可能。

