

抗がん剤療法


プロトコール登録名称

CAPOX+ゾルベツキシマブ療法

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	アロカリス点滴静注235mg デキサート注6.6mg パロノセトロンバッグ0.75mg ポララミン注5mg	1 V 1 V 1 袋 1 A	メイン1	30分	1日目	
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインフラッシュ用	1日目	
Rp4	ビロイ注 生理食塩液 1V(100mg)あたり注射用水5mLに溶解	mg mL	メイン2	開始～60分 mL/hr 60分～120分 mL/hr 120分以降 mL/hr	初回 1日目	800 mg/m ²
Rp5	ビロイ注 生理食塩液 1V(100mg)あたり注射用水5mLに溶解	mg mL	メイン2	開始～30分 mL/hr 30分～60分 mL/hr 60分以降 mL/hr	2回目以降 1日目	600 mg/m ²
Rp6	生理食塩液	50 mL	メイン2	ラインフラッシュ用	1日目	
Rp7	エルプラット注 デキサート注6.6mg 5%ブドウ糖液	mg 0.5 A 500 mL	メイン2	2時間	1日目	130 mg/m ² (100mg/m ²)
Rp8	5%ブドウ糖液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
	カペシタピン	mg	経口	朝夕食後	1日目夕食後 ～15日目朝食後	2000 mg/m ² (1日量)
	ジプレキサ錠	5 mg	経口	夕食後	ケモ前日 1,2,3日目	糖尿病患者 には禁忌
	デカドロン錠	8 mg	経口		2,3,4日目	

※エルプラットの用量は100mg/m²を目安に投与(当院の胃がんCAPOXはエルプラット100mg/m²で登録)



投与速度

初回 開始～60分 100mg/m²/hr、60～120分200mg/m²/hr、120分以降400mg/m²/hr と徐々に速度を上げる事ができます

2回目以降 開始～30分 75mg/m²/hr、30～60分150mg/m²/hr、60分以降300mg/m²/hr と徐々に速度を上げる事ができます