

抗がん剤療法

プロトコール登録名称	mFOLFOX6+ゾルベツキシマブ療法
------------	---------------------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	アロカリス点滴静注235mg デキサート注6.6mg パロノセトロンバッグ0.75mg ポララミン注5mg	1 V 1.5 V 1 袋 1 A	メイン1	30分	1日目	
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインフラッシュ用	1日目	
Rp4	ピロイ注 生理食塩液 1V(100mg)あたり注射用水5mLに溶解	mg mL	メイン2	開始～60分 mL/hr 60分～120分 mL/hr 120分以降 mL/hr	初回 1日目	800 mg/m ²
Rp5	ピロイ注 生理食塩液 1V(100mg)あたり注射用水5mLに溶解	mg mL	メイン2	開始～30分 mL/hr 30分～60分 mL/hr 60分以降 mL/hr	2回目以降 1日目	400 mg/m ²
Rp6	生理食塩液	50 mL	メイン2	ラインフラッシュ用	1日目	
Rp7	エルプラット注 5%ブドウ糖液	mg 250 mL	div メイン2	2時間	1日目	85 mg/m ²
Rp8	レボホリナート注 5%ブドウ糖液	mg 250 mL	div 側管1 Rp7と同時に	2時間	1日目	200 mg/m ²
Rp9	フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液	mg 50 mL	bolus メイン2	3分	1日目	400 mg/m ²
Rp10	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートフラッシュ用	1日目	
Rp11	フルオロウラシル注 生理食塩液	mg mL	トレフュー ザーポンプS	46時間	1日目	2400 mg/m ²
Rp12	生食シリンジ ヘパリンロック	10 mL 10 mL		ポンプ終了後 フラッシュ用	3日目	
	ジプレキサ錠	5 mg	経口	夕食後	ケモ前日 2,3,4日目	糖尿病患者 には禁忌
	デカドロン錠	8 mg	経口		2,3,4日目	

【期間】

2週1回

___サイクル実施予定

投与速度

初回 開始～60分 100mg/m²/hr、60～120分200mg/m²/hr、120分以降400mg/m²/hr と徐々に速度を上げる事ができます

2回目以降 開始～30分 75mg/m²/hr、30～60分150mg/m²/hr、60分以降300mg/m²/hr と徐々に速度を上げる事ができます