

抗がん剤療法

プロトコール登録名称	ゲムシタビン+シスプラチン療法(28日間)
------------	-----------------------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
--	-----	-----	------	------	-----	-------

1日目

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	デキサート6.6mg 生理食塩液	1 V 50 mL	div メイン1	15分	1日目	
Rp3	ゲムシタビン注 5%ブドウ糖液	mg 50 mL	div メイン2	30分	1日目	1000 mg/m ²
Rp4	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	

2日目

Rp1	生理食塩液 硫酸マグネシウム補正液	500 mL 10 mL	div メイン1	2時間	2日目	
Rp2	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ルートフラッシュ用	2日目	
Rp3	ホスアプレピタント注150mg デキサート注6.6mg パロノセトロンバッグ0.75mg	1 V 1.5 V 1袋	div メイン1	30分	2日目	
Rp4	シスプラチン注 生理食塩液	mg 500 mL	div メイン2	2時間	2日目	70 mg/m ²
Rp5	フロセミド注	20 mg	iV 側管	全開	2日目	
Rp6	生理食塩液	500 mL	div メイン1	2時間	2日目	
Rp7	ソルアセトF	500 mL	div メイン1	24時までキープ	2日目	

3日目

Rp1	デキサート6.6mg 生理食塩液	1 V 50 mL	div メイン1	15分	3日目	
Rp2	ソリタT3	500 mL	div メイン1	6時間	3日目	
Rp3	ソルアセトF	500 mL	div メイン1	6時間	3日目	
Rp4	ソルアセトF	500 mL	div メイン1	6時間	3日目	

4日目

Rp1	デキサート6.6mg 生理食塩液	1 V 50 mL	div メイン1	15分	4日目	
Rp2	ソリタT3	500 mL	div メイン1	0時~6時間	4日目	
Rp3	ソルアセトF	500 mL	div メイン1	6時間	4日目	

8,15日目

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	8、15日目	
Rp2	デキサート6.6mg 生理食塩液	1 V 50 mL	div メイン1	15分	8、15日目	
Rp3	ゲムシタビン注 ブドウ糖5%	mg 50 mL	div メイン2	30分	8、15日目	1000 mg/m ²
Rp4	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	8、15日目	

【期間】



除外基準	延期基準	中止基準
PS>2 Cr<30mL/min 重篤な心疾患、呼吸器疾患 活動性の感染症 担当医が不適格と判断した場合	WBC<3.0×10 ³ Plt<3.0×10 ⁹ Grade3の有害事象	Grade4の有害事象 担当医が判断した場合